

## اثر غلظت‌های مختلف گلوکز بر بلوغ تخمک کومولوس‌دار مدل گاوی، لقاح و تکوین پیش از لانه گزینی آن در شرایط آزمایشگاه

دکتر نورالله رضائی<sup>\*</sup>، دکرسید محمد باقر هاشمی<sup>\*\*</sup>، دکتر محمد جعفر گل‌علی پور<sup>\*\*\*</sup>، دکتر ری چنگ چین<sup>\*\*\*\*</sup>

چکیده

**سابقه و هدف:** مواد مغذی و سویستراها می‌توانند در محیط کشت می‌توانند در بلوغ هسته‌ای و سیتوپلاسمی تخمک اثر بگذارند. در مورد تأثیر گلوکز بر بلوغ تخمک در محیط کشت و تکوین رویانی بعدی آن، نظرات متناقضی وجود دارد. هدف از این مطالعه تعیین اثر غلظت‌های مختلف گلوکز بر بلوغ تخمک کومولوس‌دار، لقاح و تکوین پیش از لانه گزینی آن در یک مدل گاوی است.

**مواد و روش‌ها:** تخدمان‌های گاوی از یک کشتارگاه جمع‌آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. مجموعه تخمک کومولوس (۱۱۷۰ عدد) از فولیکول‌هایی (به قطر ۲-۶ میلی‌متر) آسپیره و به طور تصادفی در چهار گروه (سه گروه تجربی و یکی کنترل) تقسیم سپس در دیش‌های کشت ارگان حاوی یک میلی‌لیتر محیط کشت بلوغ کشت داده شدند. به محیط‌های کشت بلوغ گروه‌های تجربی به ترتیب مقادیر ۳، ۱/۵، ۱/۵ و ۱ میلی‌لیتر D- گلوکز اضافه شد و همه در انکوباتور ۳۸/۵ درجه سانتیگراد، دی‌اکسید کربن ۵ درصد و هوای ۹۵ درصد با رطوبت بالا برای مدت ۲۶ ساعت کشت داده شدند. ۳۹۴ تخمک پس از کشت برای بررسی میزان بلوغ به طور تصادفی فیکس و ۷۶۷ تخمک دیگر را برای بررسی میزان لقاح و تکوین رویانی اولیه با اسپرم‌های ذوب شده گاو نر لقاح داده و بعد از ۱۸ ساعت از لقاح، ۳۸۷ تخمک (تحم فرضی) به منظور بررسی میزان لقاح فیکس و ۳۱۹ عدد دیگر در محیط‌های تکوینی مشابه تا مرحله بلاستوسیست (روز هشتم بعد از لقاح) کشت داده شدند. نمونه‌ها با استرئومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** نتایج این تحقیق نشان داد که میزان بلوغ تخمک‌ها در محیط‌های دارای گلوکز در مقایسه با گروه کنترل (به ترتیب ۸۲ و ۱۰ و ۱۰ درصد در مقابل گروه کنترل ۵۵ درصد) به طور معناداری بیشتر بوده است ( $P < 0.001$ ) گرچه میزان لقاح تخمک‌ها در بین گروه‌های مختلف فرقی نداشت (به ترتیب ۵۷، ۵۴ و ۵۰ درصد در مقابل گروه کنترل ۴۹ درصد)، اما میزان تشکیل بلاستوسیست‌ها در گروه‌های مورد، به طور معناداری ( $P < 0.01$ ) بیشتر از گروه کنترل بوده است (به ترتیب ۳۰، ۳۳ و ۳۲ درصد در مقابل گروه کنترل ۱۴ درصد).

**نتیجه‌گیری:** یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که گلوکز در محیط کشت بلوغ، در بلوغ تخمک کومولوس‌دار و تکوین رویانی بعدی آن اثر مثبت دارد.

**کلیدواژه‌ها:** گلوکز، تخمک گاوی، بلوغ آزمایشگاهی، لقاح.

\* استادیار گروه بیوشیمی و ژنتیک دانشکده پزشکی ساری

\* دانشیار گروه تشریح دانشکده پزشکی ساری

\*\* دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی گرگان

\*\*\* دانشیار بخش زنان و زایمان، دانشگاه مک گیل، کانادا

\* عهده‌دار مکاتبات: مازندران، ساری، بلوار خزر، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح، تلفن تماس: ۰۳۱۰۴۱۴۳۱، نمبر: ۰۶۱۴۷۱۰۳۱۰۱۵۱-۳۲۴۱۰۳۱، نمبر: ۰۶۱۴۷۱۰۳۱۰۱۵۱-۳۲۴۱۰۳۱

## مقدمه

تخمک، نقش مهم و کلیدی را بازی می‌کنند از طرف دیگر حضور هورمون محرکه فولیکولی باعث افزایش جذب گلوکز به وسیله مجموعه اووسیت، کومولوس شده و حضور هورمون لوتئینیزینگ در محیط کشت قدرت تکاملی اووسیت‌ها را افزایش داده و اکسیداسیون گلوکز در داخل مجموعه کومولوس، اووسیت را افزایش می‌دهد (۱۱). استفاده تخمک از پیرووات به واسطه ارتباطش با سلول‌های کومولوس است (۱۲). Geshi و همکارانش در سال ۲۰۰۰ گزارش کردند که سدیم پیرووات در محیط بلوغی بدون سرم، می‌تواند بلوغ هسته‌ای تخمک‌های گاوی عاری از کومولوس را حمایت کند و پیش ببرد (۱۳)، اما Zheng و همکارانش در سال ۲۰۰۱ نشان داده‌اند که پیرووات به تنها بلوغ سیتوپلاسمی تخمک کافی نیست (۱۴). Sutton و همکارانش در سال ۲۰۰۳ اظهار داشتند گرچه تخمک‌ها توانایی محدودی در استفاده از گلوکز دارند، اما سلول‌های کومولوس می‌توانند گلوکز را از طریق گلیکولیز به پیرووات یا لاكتات متabolیزه کنند تا به وسیله تخمک‌ها مورد استفاده قرار گیرد (۱۵). همچنین سلول‌های کومولوس می‌توانند با حضور اسید آمینه سیستئین در محیط کشت بلوغ، گلوتاتیون را که یک ماده آنتی‌اکسیدان در داخل سلول است بسازند (۱۶).

بلوغ مجموعه تخمک، کومولوس در محیط بدون گلوکز منجر به اختلال در گسترش کومولوس و تکوین رویان می‌شود (۱۰). اما محققین دیگر اظهار داشتند که حضور، گلوکز در محیط کشت بلوغ تخمک در شرایط آزمایشگاه در تکوین رویانی پیش از جایگزینی رویان‌های هامستر (۱۶)، موش (۱۷) و گاو (۱۸-۲۰) می‌تواند اثرات

رشد و تکوین اولیه رویان، نیاز به فعالیت متابولیکی قابل توجه برای تولید انرژی (ATP) و سنتز انواع مولکول‌های پیچیده دارد (۱). مواد مغذی و سوبستراهای مختلف انرژی مورد استفاده برای بلوغ تخمک در شرایط آزمایشگاه، بر بلوغ هسته‌ای و سیتوپلاسمی تخمک به شدت تأثیر گذاشته و بعد از لقاح تخمک بر تکوین رویان اثر می‌گذارند (۲). تکوین رویان شدیداً تحت تأثیر شرایط بلوغ تخمک قرار دارد (۳). گلوکز، پیرووات و لاكتات سوبستراهای اصلی برای متابولیسم انرژی در سلول‌های پیکری (کومولوس) هستند (۴ و ۵). پیرووات سوبسترای اصلی انرژی است که می‌تواند به طور مستقیم به وسیله تخمک و تخم استفاده شود (۶). همچنین گلوتامین می‌تواند به عنوان یک سوبسترای انرژی، در بهبود بلوغ آزمایشگاهی تخمک‌های هامستر (۷) و خرگوش (۸) عمل کند. گزارش شده است که گلوکز و گلوتامین جهت پیشبرد سنتز ترکیبات پورینی جدید در داخل سلول‌های پیکری کومولوس، با هم عمل می‌کنند به طوری که زمان و مدت سنتز این ترکیب، تعیین‌کننده توقف یا ادامه تقسیم میوزی در تخمک‌ها خواهد بود (۹). به علاوه در طول بلوغ آزمایشگاهی تخمک مقداری از گلوکز می‌تواند به گلوکز آمین تبدیل شود و برای سنتز ماتریکس خارج سلولی و گسترش کومولوس استفاده شود (۱۰). همچنین گزارش شده است که ترکیب گلوکز و ۱۱ اسید آمینه در طول بلوغ آزمایشگاهی تخمک، برای تکامل بعد از لقاح رویان گاو مهم هستند (۱۰).

تحقیقات نشان داده است که سلول‌های کومولوس در استفاده از سوبستراهای انرژی (شامل گلوکز، پیرووات،

مجموعه تخمک، کومولوس چهاربار به سرعت در محیط فر با شستشوی تخمک (Hepes Buffered Tyrodes Medium) حاوی  $0/3^{\circ}$  درصد پلی وینیل پیرولیدون (TLH) میلی لیتر جنتامایسین شستشو شده‌اند (۲۴)، و به طور تصادفی به چهار گروه (سه گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدن. محیط کشت بلوغ شامل یک محیط با ترکیب شیمیابی مشخص (۲۵) که به آن  $0/3^{\circ}$  درصد PVP و  $75\text{ میلی واحد در میلی لیتر هر یک از هورمون های FSH$  و لوئیزینگ هورمون (LH) محرکه فولیکولی (FSH) اضافه شد. بر اساس مطالعه زمینه‌ای، گروه کنترل تنها در محیط کشت بلوغ، گروه تجربی ۱ در محیط کشت بلوغ با غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر D- گلوکز، گروه تجربی ۲ در محیط کشت بلوغ با غلظت  $1/5$  میلی گرم در میلی لیتر D- گلوکز و گروه تجربی ۳ در محیط کشت بلوغ با غلظت ۳ میلی گرم در میلی لیتر D- گلوکز کشت داده شدند. بعد از شستشو،  $10^{\circ}$  تخمک در  $1\text{ میلی لیتر}$  محیط کشت بلوغ در یک دیش کشت ارگان با حفره مرکزی کشت داده شدند. مجموعه تخمک - کومولوس در  $38/5^{\circ}$  درجه سانتیگراد در شرایط  $5^{\circ}$  درصد دی اکسید کربن و  $95^{\circ}$  درصد هوای خشک رطوبت در انکوباتور قرار داده شدند. بعد از  $24$  ساعت از کشت، به طور تصادفی  $776$  تخمک به منظور بررسی میزان بلوغ، فیکس شدن و  $394$  تخمک برای لقاح آزمایشگاهی استفاده شدند. همه مواد مصرفی در این تحقیق از شرکت سیگما تهیه گردیده است.

#### ● آماده کردن اسپرم و لقاح آزمایشگاهی

نهایی اسپرم در آب  $35^{\circ}$  درجه سانتیگراد برای مدت  $30$

انسانی عاری از کومولوس در طول کشت در محیط آزمایشگاه اثر مهاری دارد (۲۱). Saito و همکارانش در (سال ۱۹۹۴) گزارش کردند که گلوکز در بلوغ تخمک‌های نارس هسته‌دار (ژرمینال وزیکول) موش مفید نیست و ممکن است مانع میوز و نیز بلوغ تخمک‌های فولیکولی شود (۲۲). در حالی که Lim و همکارانش در سال ۲۰۰۰ گزارش کردند که گلوکز بلوغ هسته‌ای اووسیت‌های گاوی را به پیش می‌برد (۲۳). لذا با توجه به اظهارات متفاوت مذکور، اثر غلظت‌های مختلف گلوکز بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک و تکوین رویانی بعدی آن به بررسی بیشتری نیاز دارد. هدف از این مطالعه تعیین اثر غلظت‌های مختلف گلوکز بر روی بلوغ تخمک کومولوس‌دار گاوی، لقاح و تکوین رویانی اولیه آن در شرایط آزمایشگاه می‌باشد.

#### مواد و روش‌ها

##### ● بلوغ تخمک‌ها در شرایط آزمایشگاه

تخمدان‌های گاو (۳۴۰ عدد) از یک کشتارگاه جمع‌آوری شد. گاوها از نوع هولشتین بالای سه سال بوده‌اند. تخمک‌ها در سرم فیزیولوژی  $0/9^{\circ}$  درصد در دمای  $35^{\circ}$  درجه سانتیگراد در مدت  $2$  ساعت بعد از کشتار به آزمایشگاه انتقال داده شدند. مجموعه تخمک - کومولوس از فولیکول‌هایی به قطر  $2-6$  میلی‌متر با سرسوزن شماره  $18$  وصل به یک سرنگ  $10\text{ سی سی آسپیره}$  و در زیر لوب مجموعه تخمک، کومولوس‌هایی که دارای حداقل سه لایه سلول کومولوس در اطراف خود بوده و سیتوپلاسم هموژن داشتند، جمع‌آوری شده است. زیرا اندازه تخمک و ارتباط بین سلولی بین تخمک و سلول‌های کومولوس جهت کسب ظرفیت قابلیت بلوغ

( محلول اسید استیک و اتانول به نسبت ۱ به ۳) برای حداقل ۲۴ ساعت فیکس شدند تخمکها سپس با اورسین درصد رنگ آمیزی شدند (۲۵). لامهای در زیر میکروسکوپ فاز کنتراست از نظر بلوغ تخمک و میزان لقاح بررسی شدند (۲۵).

بلوغ تخمکها به صورت تخمک نارس هسته دار (germinal vesicle)، مرحله متافاز یک (MI) با مشاهده کروموزوم های موجود در هسته و بدون مشاهده جسم قطبی اولیه، مرحله متافاز دو (MII) با مشاهده جسم قطبی اولیه و کروموزوم های موجود در هسته سلول تعیین گردید. لقاح با مشاهده دو پرونوکلتوس همرا با دم اسperm در سیتوپلاسم مشخص شده است. همچنانی تخمک هایی با دو پرونوکلتوس و یک جسم قطبی ثانویه واضح اما بدون دم اسperm هم به عنوان لقاح یافته تلقی شده اند.

میزان تخمک های بالغ، میزان تخمک های لقاح یافته و میزان بلاستوسیست های گروه ها محاسبه گردید برای مقایسه آماری از آزمون کای اسکویر استفاده شده و مقدار P کمتر از ۵٪ معنادار تلقی شده است.

### یافته ها

همان طوری که در جدول ۱ نشان داده شده است، میزان بلوغ تخمک های در محیط های بلوغ گروه های تجربی محتوی ۳، ۱/۵ و ۱ میلی گرم در میلی لیتر گلوکز (به ترتیب ۷۹، ۸۰ و ۸۲ درصد) بیشتر از میزان بلوغ تخمک های در محیط بدون گلوکز یا محیط کنترل (۵۵ درصد) بوده است، آزمون نشان داد که این اختلاف به لحاظ آماری معنادار می باشد ( $P < 0.001$ ) اما بین میزان بلوغ تخمک در

همکارانش در سال ۲۰۰۲ شرح داده اند به روش شناور کردن (swim-up) آماده شدند (۲۴). سپس اسperm و تخمک در قطرات ۵۰ میکرولیتر از محیط لقاح (modified Tyrodes medium) mTALP میلی لیتر هپارین در زیر روغن در دمای ۳۸/۵ درجه سانتیگراد در ۵ درصد دی اکسید کربن و ۹۵ درصد هوا با ماکزیم رطوبت به مدت ۱۸ ساعت انکوبه شدند (۲۴). غلظت نهایی اسperm در هر قطره  $10^6 \times 1$  اسperm در هر میلی لیتر بود و در هر قطره ۵ تخمک قرار داده شد.

### ● کشت جنین

بعد از ۱۸ ساعت از لقاح ۳۸۷ تخمک (زیگوت فرضی presumptive zygote) برای بررسی میزان لقاح به طور تصادفی فیکس و ۳۸۹ تخمک برای بررسی تکوین رویانی اولیه سه بار در محیط TLH شستشو داده شدند و سپس به قطره ۵۰ میکرولیتری محیط تکوینی Bovine و سپس به قطره ۱۰ میکرولیتری محیط BECM میلی گرم در میلی لیتر (Embryo Culture Medium) BECM (Bovine Serum Albumin) BSA و ۱ میکرولیتر جنتامایسین در زیر روغن کشت داده شدند (۲۲). جنین ها ۱۲۰ ساعت بعد از لقاح در محیط مذکور کشت داده شدند و سپس به محیط کشت دیگری حاوی قطرات ۵۰ میکرولیتری محیط BECM مکمل با ۱۰ درصد سرم جنینی گوساله Fetal Calf Serum =FCS) اسید پیروویک در زیر روغن برای کشت تکوینی بیشتر (تا ۱۹۲ ساعت یا روز هشتم بعد از لقاح) قرار داده شدند.

### ● ثابت کردن (فیکس) تخمک ها

بعد از ۲۴ ساعت بلوغ و ۱۸ ساعت از لقاح، تخمک های به وسیله پیپتاژ مکانیکی از سلول های کومولوس عاری

جدول ۱- اثر غلظت‌های مختلف گلوکز در محیط کشت بلوغ، بر روی میزان بلوغ تخمک کومولوس‌دار گاوی، لقاح و تکوین روانی اولیه آنها

در شرایط آزمایشگاه \*

فرابانی بلاستوپیست‌ها، در روز هشتم بعد از لقاح			فرابانی اووسیت‌های لقاح یافته			فرابانی اووسیت‌های بلوغ یافته به مرحله متافاز دو			غلظت گلوکز (mg/l)
درصد	تعداد نمونه	موارد مثبت	درصد	تعداد نمونه	موارد مثبت	درصد	تعداد نمونه	موارد مثبت	
۱۴	۱۳ <sup>a</sup>	۹۳	۴۹	۴۵ <sup>a</sup>	۹۲	۵۵	۵۲ <sup>a</sup>	۹۵	۰
۳۰	۲۹ <sup>b</sup>	۹۷	۵۷	۵۶ <sup>a</sup>	۹۹	۸۲	۸۳ <sup>b</sup>	۱۰۱	۱
۳۳	۳۳ <sup>b</sup>	۱۰۰	۵۴	۵۲ <sup>a</sup>	۹۶	۷۹	۷۸ <sup>b</sup>	۹۹	۱/۵
۳۲	۳۲ <sup>b</sup>	۹۹	۵۰	۵۰ <sup>a</sup>	۱۰۰	۸۰	۷۹ <sup>b</sup>	۹۹	۳

\* داده‌ها از ۶ بار تکرار آزمایش جمع‌آوری شده‌اند.

در هر ستون، اعداد با نشانه‌های مختلف، اختلاف معناداری با گروه کنترل (یا مقدار صفر) دارند (از راست به چپ در ستون ۲: P&lt;0.001) a,b

در ستون ۳، P&lt;0.05) ستون ۴، (P&lt;0.01).

## بحث

یافته‌های این تحقیق نشان داد که افزودن گلوکز به محیط کشت بلوغ اووسیت گاوی، در مقایسه با کنترل به طور معناداری سبب بلوغ اووسیت نابالغ می‌شود (P<0.001) و نتایج گزارشات قبلی در این زمینه را تأیید می‌کند (۲۶ و ۲۷).

گرچه درصد بلوغ اووسیت‌ها در مطالعه حاضر (جدول ۱) به مرتب بیشتر از درصد اووسیت‌های بلوغ یافته در نتایج گزارش شده توسط Hashimoto و همکارانش در سال ۲۰۰۰ بوده است که این تفاوت می‌تواند ناشی از ترکیبات محیط کشت بلوغ و شرایط کشت باشد، بلکه مشابه نتایج آنها با افزایش غلظت گلوکز در محیط بلوغ، درصد بلوغ اووسیت کاهش داشته است (۸۰ درصد با ۳ میلی‌گرم در میلی‌لیتر در مقابل ۸۲ درصد با ۱ میلی‌گرم در میلی‌لیتر). بنابراین نتایج نشان می‌دهد که غلظت پائین

معناداری وجود نداشت. همچنین میزان گسترش کومولوس در گروه‌های تجربی در مقایسه با گروه مورد به مرتب بیشتر بوده است. بین میزان لقاح تخمک‌های گروه‌های تجربی (به ترتیب ۵۷، ۵۴ و ۵۰ درصد) در مقایسه با گروه کنترل (۴۹ درصد) اختلاف معناداری وجود نداشت. همچنین میزان تشکیل بلاستوپیست در گروه‌های تجربی (به ترتیب ۳۰، ۳۳ و ۳۲ درصد) بیشتر از گروه کنترل (۱۴ درصد) بوده است و آزمون نشان داد که این اختلاف به لحاظ آماری معنادار می‌باشد (P<0.01). بین میزان تشکیل بلاستوپیست در گروه‌های تجربی با غلظت‌های مختلف گلوکز اختلاف معناداری وجود نداشت.

تعداد کل تخمک‌ها ۱۱۷۰ عدد (۳۹۴ تخمک در ستون ۲ برای بررسی میزان بلوغ، ۳۸۷ تخمک در ستون ۳ برای بررسی میزان لقاح و ۳۸۹ تخمک در ستون ۴ برای

ماده یک پیش ساز متابولیک برای سنتز هگزو ز آمین ها است و افزودن آن به محیط کشت باعث بهبود گسترش سلول های کومولوس توده کومولوس - اووسیت می گردد، همراه با گلوکز اضافه شده به محیط کشت بلوغ اسید هیالورونیک را می سازند. اسید هیالورونیک باعث گسترش سلول های کومولوس شده و سلول های کومولوس که در طول بلوغ آزمایشگاهی نقش مهمی در جذب گلوکز دارند، گلوکز موجود در محیط را جذب نموده و به پیرووات تبدیل می کند (۲۹).

همچنین نقش اصلی گلوکز در طول بلوغ اووسیت به خصوص در مراحل آغازین بلوغ آزمایشگاهی اووسیت، تولید TP و اسید کربوکسیلیک از طریق گلیکولیز است (۱۱).

افزودن گلوکز به محیط کشت، گلیکولیز اووسیت را افزایش می دهد و بالارفتن میزان گلیکولیز در اووسیت های بلوغ یافته در شرایط آزمایشگاه، قدرت تکوینی اووسیت را بالا می برد (۲۶). بعلاوه مجموعه کومولوس - اووسیت علاوه بر راه گلیکولیز، از راه پنتوز فسفات گلوکز را متابولیزه می کند و به نظر می رسد متابولیت های گلوکز ضمن تولید انرژی، در تنظیم بلوغ میوزی اووسیت و نیز در سنتز نوکلئوپورین ها چهت تنظیم بلوغ هستدای اووسیت شرکت می کند (۱۰ و ۲۶) و بنابر اظهارات Sutton و همکارانش (۳۰)، غلظت گلوکز در طول بلوغ مجموعه اووسیت - کومولوس روی چندین عمل شامل پیشرفت میوزدر اووسیت، قابلیت تکوینی اووسیت و گسترش کومولوس تأثیر می گذارد.

گرچه در مطالعه حاضر حضور ۱ میلی گرم در میلی لیتر گلوکز یا بیشتر در محیط کشت بلوغ اووسیت

برای تکامل رویان فراهم می کند اما افزایش غلظت گلوکز باعث افزایش درصد بلوغ اووسیت نمی گردد. مطالعات در این زمینه نشان داده است که غلظت پائین گلوکز در طول کشت جنین های گاوی سودمند است اما غلظت بالای گلوکز در محیط کشت، تکامل رویانی اولیه در شرایط آزمایشگاه را مهار می کند و تأثیرات معکوس روی تکامل بعدی جنین دارد. پیشنهاد شده است این تأثیرات ممکن است مربوط به افزایش تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و کاهش ذخیره داخل سلولی گلوتاتیون باشد (۲۰، ۲۲، ۲۷ و ۲۸).

تحقیقات نشان داده است که سلول های کومولوس در استفاده از سوبستراهای انرژی (مانند گلوکز) در طول بلوغ آزمایشگاهی اووسیت نقش مهم و کلیدی را بازی می کنند، به طوری که در فقدان این سلول ها، اووسیت های نابالغ پستانداران به علت نقص در انتقال گلوکز سطح بسیار پایینی از جذب، فعالیت گلیکولیتیک و اکسیداسیون گلوکز را از خود نشان می دهند (۲۲ و ۲۶). از طرفی گسترش مطلوب توده کومولوس برای اولاسیون طبیعی و نیز لقادیر بعدی ضروری به نظر می رسد (۱).

مطالعات نشان داده است که اسید هیالورونیک عامل اصلی گسترش کومولوس است (۱۱). گلوکز، گلوتامین و هگزو ز آمین ها از سوبستراهای اصلی سنتز اسید هیالورونیک هستند، به طوری که ناکافی بودن سوبستراها برای سنتز اسید هیالورونیک (مانند گلوکز) در محیط کشت بلوغ منجر به اختلال در تکمیل بلوغ هستدای (۲۷)، گسترش اووسیت و تکوین بلاستوسیست می شود (۱۰)؛ لذا پیشنهاد می شود با توجه به این که یکی از ترکیبات موجود در محیط کشت بلوغ تحقیق ما مشابه

علت این سوبسترای انرژی منحصر به فرد مربوط به فعالیت گلیکولیتیک پایین و توقف یکی از آنزیم‌ها مانند ۶-فسفات- فروکتوکیناز است (۶). Iwata و همکارانش در سال ۱۹۹۸ گزارش کرده‌اند که متاپولیسم گلوکز در سراسر تکوین رویانی متغیر است، به‌طوری‌که در مراحل اولیه تکوین رویان گاوی با حضور درصد کم گلوکز در محیط کشت بلوغ، متاپولیسم گلوکز در مقایسه با مورولا یا بلاستوسیست پایین است. اما حضور غلظت بالای گلوکز (۴/۵ میلی‌مول) در محیط کشت بلوغ، تکوین رویانی از مرحله ۴ سلولی به مرحله بلاستوسیست را مهار می‌کند (۲۰).

مطالعات متعددی نشان داده است که گلوکز زیادی در محیط کشت بلوغ در تکوین اووسیت‌های هامستر (۱۶ و ۳۱)، گاو (۱۸-۲۰) و موش (۲۰، ۲۱ و ۳۲) به مرحله بلاستوسیست اختلال ایجاد می‌کند که این امر می‌تواند احتمالاً به‌علت افزایش رادیکال‌های آزاد اکسیژن و کاهش گلوتاتیون داخل سلولی موجود در اووسیت باشد، زیرا رادیکال‌های آزاد اکسیژن بیشتری در شرایط کشت آزمایشگاهی نسبت به شرایط کشت داخل بدن تولید می‌شود که این امر می‌تواند مربوط به زیر حد مطلوب بودن فشار اکسیژن باشد (۲۰ و ۲۸). اکسیژن برای ادامه حیات نیاز است اما متاپولیت‌هایش نظر اندواع

اکسیژن‌های فعال (Reactive oxygen Species (ROS)) می‌تواند عمل سلول را تغییر دهد و یا برای حیات سلول خطرساز باشد. بنابراین بهمنظور حفظ عمل طبیعی سلول، ROS اضافی باید به‌طور دائم غیرفعال شود که این عمل به‌وسیله آنتی‌اکسیدان‌های موجود در سلول رخ می‌دهد. آئیون سوپراکسید ( $O_2^-$ )، رادیکال هیدروکسیل

نداشت، اما به‌طور معناداری سبب تکوین رویانی بعدی تا مرحله بلاستوسیست شده است (P<۰/۰۱). نتایج ما از نظر میزان لقادیر با نتایج گزارش Hashimoto و همکارانش (۲۷) تفاوت داشته است که این تفاوت ممکن است ناشی از محیط کشت لقادیر و کیفیت اسپرم باشد، اما از نظر میزان بلاستوسیست با مطالعات قبلی در این زمینه مطابقت داشته است (۱۰، ۲۶ و ۲۷) و با نتایج تحقیق Iwata و همکارانش (۲۰) که گزارش کرده‌اند غلظت ۴/۵ میلی‌مول گلوکز در محیط کشت بلوغی، تکوین رویانی به مرحله بلاستوسیست را در مقایسه با کنترل به‌طور معناداری مهار می‌کند اما اختلاف معناداری بین غلظت ۱/۵ میلی‌مول گلوکز با گروه کنترل روی تکوین رویانی وجود ندارد، مغایرت داشته است زیرا همان‌طوری که این محققین اظهار داشته‌اند آن‌ها در ترکیب محیط کشت بلوغی خود از FCS ۱۰٪ استفاده کرده‌اند که حاوی ۰/۰۵ میلی‌گرم گلوکز بوده است و در گروه‌های مورد و شاهد وجود داشت. لذا ما در این تحقیق برای رفع این مشکل به جای FCS از PVP استفاده کردیم. به‌نظر می‌رسد با توجه به متغیر بودن متاپولیسم گلوکز تأثیر آن در مراحل اولیه تکوین رویانی چندان محسوس نباشد اما با پیشرفت تکوین اثرات خود را بیشتر نشان خواهد داد.

در مطالعات انجام‌شده روی مرحله پیش از لانه گزینی رویان موش نشان داده شد که تغییرات مهمی در متاپولیسم انرژی در طول کلیواژ روی می‌دهد. مهم‌ترین این تغییرات در ارتباط با استفاده از گلوکز است. برای مثال رویان دو سلولی موش نمی‌تواند از هر دو سوبسترا (گلوکز و پیرووات) استفاده کند بلکه تنها می‌تواند از پیرووات استفاده کند اما بر خلاف آن رویان هشت

### نتیجه گیری

یافته های این تحقیق نشان داد که حضور گلوکز در محیط کشت بلوغ برای بلوغ اووسیت کومولوس دار گاوی و تکامل رویانی بعدی اثر مثبت دارد. به طوری که غلظت پایین گلوکز (۱ میلی گرم در میلی لیتر) نه تنها برای بلوغ اووسیت گاوی مؤثر است بلکه برای تکوین بعدی رویان مفید می باشد اما افزایش غلظت گلوکز باعث افزایش درصد بلوغ اووسیت نمی گردد.

### تشکر و قدردانی

بدین وسیله محققان مراتب تقدیر و تشکر خود را از همکاری آقایان احمد کمال عبدالجلیل و جین ته چونگ اعلام می دارند.

اصلی هستند (۲۸ و ۳۳). رادیکال های آزاد اکسیژن تولید شده در شرایط آزمایشگاه با پروتئین ها، لیپید ها و سلول واکنش نشان می دهند و منجر به غیرفعال شدن آنزیم ها، پراکسیداسیون غشای لیپیدی و تغییرات DNA می شود. غلظت بالای هیدروکسید اکسیژن سبب پراکسیداسیون لیپید می شود و منجر به مرگ سلول می شود. همچنین شواهدی وجود دارد که تولید رادیکال های آزاد به وسیله اتواکسیداسیون گلوکز در شرایط فیزیولوژیکی ایجاد می شود که به نوبه خود تکثیر سلولی را طولانی می کند یا تغییرات بیوشیمیایی ایجاد می کند که عمل سلول را تغییر می دهد یا سبب مرگ سلولی در محیط آزمایشگاه می شود (۲۰ و ۲۸).

## Abstract:

### *Effect of Various Concentrations of Glucose on Bovine Cumulus-Oocyte Complexes Maturation, Fertilization and Early Embryonic Development in Vitro*

**Rezaei, N.<sup>1</sup>; Hashemi, S.M.B<sup>2</sup>; Golalipour, MJ.<sup>3</sup>; Chian, R.C.<sup>4</sup>**

1. Associate professor, Department of Anatomy, Mazandaran University of medical sciences, Iran.

2. Assistant professor, Department of Biochemistry & Genetics, Mazandaran University of medical sciences, Iran.

3. Associate professor, Department of Anatomy, Gorgan University of medical sciences, Iran.

4. Associate professor, Department of Gynecology, McGill University, Canada.

**Background & Objectives:** Different energy substrates and nutrients can greatly influence oocyte nuclear and cytoplasmic maturation. Effect of glucose on in-vitro oocyte maturation and subsequent early embryonic development is controversial. The objective of the present study was to verify the effect of various concentrations of glucose on cumulus-oocyte complexes maturation, fertilization and early embryonic development using a bovine model.

**Materials & Methods:** Ovaries were collected from the local abattoir and brought into laboratory. Cumulus-oocyte complexes ( $n=1170$ ) were aspirated from follicles, randomly divided into 4 groups (3 treatment/experimental & 1 control), and cultured in an organ culture dish containing 1 ml maturation medium, in treatment groups, chemically defined medium, supplemented with 1.0, 1.5 or 3.0 mg/ml D-glucose respectively, at 38.5 degrees on the Celsius scales in an atmosphere of 5% CO<sub>2</sub> and 95% air with high humidity for 24 hours. Following maturation, 394 oocytes were fixed randomly for 24h, for maturation rates; and 776 oocytes were inseminated with frozen-thawed bull semen for fertilization rates and early embryonic development, 387 oocytes (presumptive zygotes) fixed randomly for fertilization rates, and 389 oocytes (presumptive zygotes) were cultured for development with similar medium to blastocyst stage (day 8). The samples were examined by stereomicroscope and the results were analysed by  $\chi^2$  test.

**Results:** The oocytes maturation rates were higher ( $P<0.001$ ) in the medium contained glucose compared to the control group (82%, 79% and 80% vs. 55% respectively). Although fertilization rates of oocytes were not different among groups, (57%, 54% and 50% vs. 49% respectively), the rates of blastocyst formation in the treatment group were significantly higher ( $p<0.01$ ) than the control (30%, 33% and 32% vs. 14%).

**Conclusion:** These results confirm that the presence of glucose, in the maturation medium, is important for oocyte maturation and the subsequent embryonic development.

**Keywords:** Bovine Oocyte, In Vitro Maturation, Glucose, Fertilization.

**منابع**

1. Furnus CC, Matos DG, De Martinez AG, Matkovic M. Effect of glucose on embryo quality and post-thaw viability of in-vitro-produced bovine embryos. *Theriogenology* 1997; 47:481-90
2. Dows SM, Hudson GD. Energy substrates and the completion of spontaneous meiotic maturation. *Zygote* 2000; 8:339-51
3. Sutton-McDowall ML, Gilchrist RB, Thompson JG. Cumulus expansion and glucose utilization by bovine cumulus-oocyte complexes during in vitro maturation: the influence of glucosamine and follicle-stimulating hormone. *Rproduction* 2004; 128(3):313-19
4. Kim JH, Funahashi H, Niwa K, Okuda K. Glucose requirements at different developmental stages of in vitro fertilized bovine embryos cultured in semi-defined medium. *Theriogenology* 1993; 39:875-86
5. Rieger D, Loskutoff NM. Changes in the metabolism of glucose, Pyruvate, glutamine and glycine during maturation of cattle oocytes in vitro. *J Reprod Fertil* 1994; 100:257-62
6. Leese HJ, Barton AM. Pyruvate and glucose uptake by mouse ova and preimplantation embryos. *J Reprod Fertil* 1984; 72(1):9-13
7. Gwatkin and Haidri. Requirements for the maturation of hamster oocytes in vitro. *Exp Cell Res* 1973; 76(1):1-7
8. Bae IH, Foote RH. Utilization of glutamine for energy and protein synthesis by cultured rabbit follicular oocytes. *Exp Cell Res* 1975; 90(2):432-6
9. Downs SM, Verhoeven A. Glutamine and the maintenance of meiotic arrest in mouse oocytes: influence of culture medium, glucose, and cumulus cells. *Mol Reprod Dev* 2003; 66(1):90-7
10. Rose-Hellekant TA, Libersky-Williamson EA, Bavister BD. Energy substrates and amino acids provided during in vitro maturation of bovine oocytes alter acquisition of developmental competence. *Zygote* 1998; 60:285-294
11. Sutton-McDowall ML, Gilchrist RB, Thompson JG. Effects of in-vivo and in-vitro environments on the metabolism of the cumulus-oocyte complex and its influence on oocyte developmental capacity. *Hum Reprod Uptake* 2003; 9(1):35-47
12. Leese HJ, Barton AM. Production of pyruvate by isolated mouse cumulus cells. *J Exp Zool* 1985; 234(2):231-

13. Geshi M, Takenouchi N, Yamauchi N, Nagai T. Effects of sodium pyruvate in nonserum maturation medium on maturation, fertilization, and subsequent development of bovine oocytes with or without cumulus cells. *Biol Reprod* 2000; 63(6):1730-4
14. Zheng P, Bavister BD, Ji W. Energy substrate requirement for in vitro maturation of oocytes from unstimulated adult rhesus monkeys. *Mol Reprod Dev* 2001; 58(3):348-55
15. de Matos D, Gasparrini B, Pasqualini SR, Thompson JG. Effect of glutathione synthesis stimulation during in vitro maturation of bovine oocytes on embryo development and intracellular peroxide content. *Theriogenology* 2002; 57:1443-51
16. Barnett DK, Bavister BD. Inhibitory effects of glucose and phosphate on the second cleavage division of hamster embryos is it linked to metabolism? *Hum Reprod* 1996; 11:177-83
17. Chatot CL, Ziomek CA, Bavister BD, Lewis JL, Torres I. An improved culture medium supports development of random-bred 1-cell mouse embryos in vitro. *J Reprod Fertil* 1989; 86(2):679-88
18. Takahashi Y, First NL. In vitro development of bovine one-cell embryo: influence of glucose, lactate, pyruvate, aminoacids and vitamins. *Thriogenology* 1992; 37:963-78
19. Donnini D, Zambite AM, Perrella G, Ambesi-Impiombato FS, Curcio F. Glucose may induce cell death through a free radical-mediated mechanism. *Biochem Biophys Res Commun* 1996; 219:412-17
20. Iwata H, Akamatsu S, Minami N, Yamada M. Effects of antioxidants on the development of bovine IVM/IVF embryos in various concentrations of glucose. *Theriogenology* 1998; 50:365-75
21. Cekleniak NA, Combelles CM, Ganz DA, Fung J, Albertini DF, Racowsky C. A novel system for in vitro maturation of human oocytes. *Fertil Steril* 2001; 75(6):1185-93
22. Saito T, Hiroi M, Kato T. Development of glucose utilization studied in single oocytes and preimplantation embryos from mice. *Biol Reprod* 1994; 50:266-70
23. Lim Jm, Lee BC, Lee EC, Chung HM, Koj J, Paik SE, et al. In vitro maturation and in vitro fertilization of bovine oocytes cultured in a chemically defined, protein free medium: effects of carbohydrates and amino acids. *Reprod Fertil Dev* 1999; 11(2):127-32
24. Chian RC, Chung J, Downey BR, Tan SL. Maturational and developmental competence of immature oocytes retrieved from bovine ovaries at different phases of folliculogenesis. *Reprod Biomed Online* 2002; 4(2):129-34
25. Rezaei N, Chian RC. Effects of essential and non-essential amino acids on in vitro maturation, fertilization

26. Krisher RL, Bavister BD. Enhanced glycolysis after maturation of bovine oocytes in vitro is associated with increased developmental competence. *Mol Reprod Dev* 1999; 53(1):19-26
27. Hashimoto S, Minami N, Yamada M, Imai H. Excessive concentration of glucose during in vitro maturation impairs the developmental competence of bovine oocytes after in vitro fertilization: relevance to intracellular reactive oxygen species and glutathione contents. *Mol Reprod Dev* 2000; 56:520-26
28. Iwata H, Hashimoto S, Ohota M, Kimura K, Shibano K, Miyake M. Effects of follicle size and electrolytes and glucose in maturation medium on nuclear maturation and developmental competence of bovine oocytes. *Reprod* 2004; 127:159-64
29. Gandolfi F, Milanesi E, Pocar P, Luciano AM, Brevini TAL, Acocella F, et al. Comparative analysis of calf and cow oocytes during in vitro maturation . *Mol Reprod Dev* 1998; 49:168-75
30. Sutton-McDowall ML, Gilchrist RB, Thompson JG: Effect of hexoses and gonadotrophin supplementation on bovine oocyte nuclear maturation during in vitro maturation in a synthetic follicle fluid medium. *Rprod Fertil Dev* 2005; 17(4):407-15
31. McKiernan SH, Bavister BD, Tasca RJ.Energy substrate requirements for in-vitro development of hamster 1- and 2-cell embryos to the blastocyst stage. *Hum Reprod* 1991; 6(1):64-75
32. Downs SM, Humpherson PG, Martin KL, Leese HJ. Glucose utilization during gonadotropin-induced meiotic maturation in cumulus-enclosed mouse oocytes. *Mol Reprod Dev* 1996; 44:121-31
33. Agarwal A, Saleh RA, Bedaiwy MA. Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human reproduction. *Fertil Steril* 2000; 79:829-43